
Subject: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Jackie](#) on Thu, 13 Aug 2009 19:03:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

habe vorhin gesehen,dass Mogli ein Stück Fell zwischen Ohr und Auge fehlt.Bei genauerem hinsehen hab ich gesehen dass dort auch eine Wunde ist.Ich weiss aber nicht ob dort eine Borke ist.Uns ist schon die letzten Tage aufgefallen,dass er sich sehr zurückgezogen hat. Es kann sein,dass er sich bei der Heuraufe verletzt hat die die Chins ein bisl abgenagt haben.Ist eine Holzraufe die man an die Wand hängt und die Heukammer ist vorne(wo die Chins das Heu rausholen können)durch Holz"gitter" getrennt.Diese Gitter haben die in der Mitte durchgebissen,sodass dort spitzen waren.Und Mogli ist dort gerne reingegangen.Wir haben die Spitzen auch entfernt.

Habe Mogli jetzt erstmal mit Jod versorgt.Haben ihn vorhin laufen lassen mit den anderen und dort lief er putzmunter rum.

Wollte jetzt erstmal gucken wie sich das entwickelt(während ich mit Jod weiterbehandel) und Samstag zum TA fahren.

Oder gibt es was besser als Jod?

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Gast](#) on Thu, 13 Aug 2009 19:13:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Jacqueline,

bei Verletzungen würde ich den Tierarzt aufsuchen. Nicht dass sich etwas entzündet und einfach Medikamente anwenden würde ich auch nicht. Ob Jod so geeignet ist bin ich nicht sicher. Mit Verletzungen habe ich nicht so die Erfahrung, aber letzte Woche wurde mir noch gesagt, dass man bei Chins kein Jod pur anwenden soll. Betaisodona als erste Hilfe wäre wohl ok. Wenn die anderen Chins das Jod abschlecken, kann das gefährlich werden.

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Jackie](#) on Fri, 14 Aug 2009 06:33:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

Jod und Betaisodona ist das nicht das gleiche? Auf jeden Fall von der Farbe und von den Anwendungsgebieten. Ich kann mich auch vielleicht irren, und die Jod Salbe ist stärker konzentriert als Betaisodona.

Werde heute mal beim TA anrufen und fragen was das beste ist. Kann morgen nämlich erst zum TA.

Oder wisst ihr was?

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Danie](#) on Fri, 14 Aug 2009 08:38:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

Betaisodona sollte nicht als Salbe verwendet werden. Sie verklebt und weicht die Wunde auf, es kann sich keine Kruste bilden, die Wunde fängt an, stärker zu wässern.

Betaisodona wenn, dann also Lösung verwenden zum abtupfen und immer (!) mit Wasser vorher verdünnen.

Heuraufen im Käfig sind gefährlich, spitz genagte Gegenstände sollten sofort beseitigt werden (splitterndes Holz, herausstehende Nägel, Krampen oder Tackerklammern).

Infos zu Verletzungen gibt es auch in den anderen Threads hier im Forum und auch auf der <http://www.chinchilla.info>

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Jackie](#) on Fri, 14 Aug 2009 09:04:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hey,

Habe jau Jod benutzt aber das wird wohl auch nicht besser sein.Habe aber auch vor dem raufmachen die Wunde mit Wasser sauber gemacht und dann das Jod drauf.Werde gleich mal beim TA anrufen und fragen was ich da machen kann,bis ich morgen zu ihm hinfahren kann.

Haben die Spitzen leider zu spät gesehen,da ein haufen heu davor hing.Jetzt sind die aber raus.

Wir haben gestern nun auch zwei tonkörbe geholt und dort das heu reingelegt.

Naja,wenn jmd. ein Mittel weiss,dass ich vorübergehend raufschmieren kann,dann bitte melden.
Danke.

edit:Habe nun beim TA angerufen.Werde morgen dahin fahren und dann will er sich das anschauen und mir ne Salbe geben.

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Gast](#) on Fri, 14 Aug 2009 10:05:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich meinte auch Betaisodona-Lösung, die man verdünnt anwendet. Die Salbe kenne ich nicht. Die Lösung habe ich für Notfälle da, zur Erstversorgung.

@Jackie: alles Gute für den Kleinen. :)

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Danie](#) on Fri, 14 Aug 2009 10:10:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

auch Jodlösung sollte immer verdünnt angewendet werden.

Zur Wunddesinfektion gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe dafür Kodan im Haus, damit wird das abgetupft oder besprüht (auch bei uns Menschen).

Wie gesagt, salben würde ich nur dann, wenn es eine Salbe mit Antibiotika ist, weil es sich entzündet hat und der TA das verschrieben hat.

Sonst ist es wirklich besser, wenn man es trocknen lässt oder nach dem reinigen nur etwas Bepantol drauf macht.

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Jackie](#) on Fri, 14 Aug 2009 10:27:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hey,

okay, Bepantol hab ich auch. Fahren nachher zum TA und dann mal schauen was er sagt.

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Jackie](#) on Fri, 14 Aug 2009 17:05:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

waren jetzt mit Mogli und Stitch beim TA. Der TA hat bei Mogli ne fette Borke abgezogen und zugenäht. Er meint, es wäre ein Abzess. Hat aber nicht geeitert. Er hat mir auch eine Salbe mitgegeben. Die heisst "Nekrolyt".

Stitch war zur Unterstützung mit.

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Tressa](#) on Fri, 14 Aug 2009 23:27:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

surfmaus schrieb am Fr, 14 August 2009 12:10Hi,

auch Jodlösung sollte immer verdünnt angewendet werden.

Zur Wunddesinfektion gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe dafür Kodan im Haus, damit wird das abgetupft oder besprüht (auch bei uns Menschen).

Hallo surfmaus,

Jodlösung wird auch bei uns Menschen unverdünnt angewendet, und ist mit Sicherheit genauso aggressiv wie Kodan-Spray. Da versteh ich nicht so ganz, warum Jodlösung dann verdünnt werden muss.

Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch, bin also auf die Erklärung gespannt.

Liebe Grüße und gute Nacht

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Danie](#) on Sun, 16 Aug 2009 08:56:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Verena,

mir hat der TA und auch mein Hausarzt gesagt, das Jodlösung bei offenen Wunden immer verdünnt werden soll, da es zu stark von der Haut und Verletzung aufgenommen wird und in den Blutkreislauf gelangt.

Wenn du etwas anderes dazu weißt, würde mich freuen, wenn du das kund tust ;)

Zu Kodan habe ich diesen Hinweis nicht bekommen.

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Tressa](#) on Sun, 16 Aug 2009 21:30:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Spontan kann ich auch nichts weiteres dazu sagen, werde mich aber auch schlau machen.

In meiner Ausbildung zur Krankenschwester habe ich nichts davon gehört, dass Jodlösung verdünnt werden sollte. Aber wie gesagt, dass interessiert mich auch. Werde morgen mal meinen Apotheker fragen.
Infos folgen!

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Chinchill82](#) on Mon, 17 Aug 2009 05:51:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Huhu,

meine TA spricht auch von Bataisodona-Lösung verdünnt mit Wasser für Wunden.
Aber auch, dass sie ab und zu mal gerne einen kleinen Tropfen Bataisodona-Lösung pur auf die Wunde gibt um diese damit auszutrocknen.
Kommt aber ja auch immer auf die jeweilige Situation drauf an.

Kodan hab ich noch nicht bei Chins angewendet, hab ich gar nicht dran gedacht.
Wir verwenden das für uns, wenn wir Kratzer etc. haben, die verheilen dann immer viel viel schneller als ohne...
Würde ich aber nicht auf offene Wunden machen...

@Jackie: Wie geht es deinem Patienten denn mittlerweile?

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Tressa](#) on Mon, 17 Aug 2009 10:00:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

also, ich hab mich schlau gemacht und muss zumindest zum Teil einlenken.

Bei Chinchillas ist (lt. Leitsymptome bei Meerschweinchen, Chinchilla und Degu, 2005)
Jodlösung 1:5 zu verdünnen und kann dann zur Desinfektion kleinerer Wunden eingesetzt werden.

Iritiert hat mich dabei die Aussage des Hausarztes. Lt. Aussage meines Apothekers ist egal bei welcher Lösung, Salbe, Gel, welche auf eine Wunde aufgetragen werden immer mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Aufnahme des Wirkstoffes durch den Organismus zu rechnen.
Jodlösung ist aber in der Regel eine gebrauchsfertige Lösung und kann beim Menschen unverdünnt aufgetragen werden. Lediglich für Umschläge oder Spülungen wird die Lösung verdünnt (lt. Hersteller).

Problematisch sehe ich jedoch das Verdünnen im Chinchillahaushalt:
Mit was wird verdünnt? Um die desinfizierende Wirkung aufrecht zu erhalten, muss

Physiologische Kochsalzlösung (NaCl 0,09%) verwendet werden. Ich bezweifle jedoch, dass die Jedermann -
noch im sterilen Zustand - im Haus hat. Wenn also zur Verdünnung Leitungswasser genommen wird, werden der Lösung krankmachende Keime zugeführt und der Zweck der Erstbehandlung von kleinen Wunden bei den Süßen ist dahin.

Ein weiterer Punkt ist die optische Veränderung der Wundverhältnisse. Durch die Braunfärbung lässt sich ggf. die Wunde nicht mehr exakt beurteilen.

Ausserdem brennt Jodlösung auf offenen Wunden. Genauso wie auch das bereits erwähnte Kodan-Spray.

Lt. Aussage des Apothekers ist Chlorhexidin da die bessere Lösung, da die Anwendung von Jodlösung ja auch beim Menschen sowieso seit Jahren sehr umstritten ist. Chlorhexidin kann lt. Leitsymptome bei Meerschweinchen, Chinchilla und Degu ebenfalls verwendet werden und brennt nicht, muss auch nicht verdünnt werden. Dies macht die Anwendung in meinen Augen wesentlich einfacher.

Ich hoffe, meine Erläuterungen waren verständlich. Für Rückfragen bin ich weiterhin offen, wie gesagt, hat mir auch neue Erkenntnisse gebracht.

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Danie](#) on Mon, 17 Aug 2009 10:13:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi du,

danke dir für deine Recherche und das Einbringen hier im Forum :)

Ich verdünne Betaisodona Lösung mit abgekochtem Leitungswasser - das dürfte soweit keimfrei sein, versteht sich für mich aber eigentlich von selbst - aber du hast recht, lieber noch mal erwähnen.

Ich hatte vor vielen Jahren ein Pferd mit schlimmer Bein-/Huf-verletzung, da wurde das Wasser auch abgekocht und damit das jodhaltige Desinfektionsmittel verdünnt - abgekühlt dann als Bad genutzt.

Subject: Re: Verletzung zwischen Ohr und Auge
Posted by [Jackie](#) on Tue, 18 Aug 2009 09:22:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

huhu,

Mogli geht es schon wieder viiiel besser. Er springt jetzt auch wieder rum und ist ganz neugierig :)

Der Arzt hatte die besagte Wunde genäht und gott sei Dank gehen die anderen auch nicht an die Naht ran. Haben nur kurz dran geschnuppert und dann mit Mogli gekuschelt.

Heilt super!
