

---

Subject: Kot-Kontrolle nach Panacur-Gabe  
Posted by [Tressa](#) on Mon, 26 Jan 2009 20:19:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo und Guten Abend,  
ich behandle jetzt meine zwei Mäuschen den zweiten 5-Tage-Zyklus mit Panacur, nachdem eine der Beiden in der Kotprobe positiv war.

Mit dem TA hab ich ausgemacht, dass wir 10 Tage nach dem 2. Zyklus für 3 Tage Kot sammeln und testen. Jetzt überlege ich mir, ob es wirklich nötig ist, von beiden getrennt den Kot zu sammeln oder ob es ausreichend wäre, die beiden am Abend in die Transportbox zu setzen und den Kot von dort (also von Beiden ungetrennt) zu nehmen und eine Probe einzuschicken. Denn erneut behandeln würden wir dann ja sowieso wieder beide.

Nicht, dass ich extrem knausrig mit dem Geld sein möchte, wenn es um die beiden geht, aber wenn eine Probe ausreichen würde?!

Was meint ihr dazu?

---

---

Subject: Re: Kot-Kontrolle nach Panacur-Gabe  
Posted by [speddy](#) on Mon, 26 Jan 2009 20:44:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Verena,  
wenn Du beide in die Box setzt und dann Kot nimmst, könnte es sein, dass Du zufällig nur von einem Tier einige Köttel erwischst.

Ich habe damals nach meiner Giardien-Behandlung 3 Tage lang von jedem meiner Tiere jeweils 3 Köttel eingesammelt und sie zusammen in einer Tüte zum TA gebracht. Da war ich mir dann sicher, von jedem Chin während der 3 Tage etwas dabei zu haben.

Aber eine gemeinsame Probe für die Untersuchung ist ok, wollte auch meine TÄ so haben.

LG  
speddy

---

---

Subject: Re: Kot-Kontrolle nach Panacur-Gabe  
Posted by [Danie](#) on Tue, 27 Jan 2009 09:05:04 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Huhu,

wir haben bei einer Gruppe beide Tiere einzeln getestet, da die Gesamtprobe nichts ergab und die Einzelprobe dann aber doch einen geringen Befall bei einem Tier feststellte (Resistenz gegen Panacur).

Sicherer ist eine Einzelpobe, eine Sammelprobe geht aber natürlich auch.

---

---

Subject: Re: Kot-Kontrolle nach Panacur-Gabe  
Posted by [Tressa](#) on Tue, 27 Jan 2009 10:20:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich danke Euch für Eure Antworten.

Ich denke, ich werde wie Speedy getrennt sammeln und dann wohl eine Mix-Probe abgeben.

Würde man denn bei einem noch geringen Befall behandeln?

---

---

Subject: Re: Kot-Kontrolle nach Panacur-Gabe  
Posted by [speedy](#) on Tue, 27 Jan 2009 10:55:39 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Verena,

falls noch Giardien nachweisbar sein sollte, geht die Behandlung weiter, da sich sowohl das betroffene Tier als auch das andere wieder daran infizieren können.  
Deshalb wird ja auch in Zyklen behandelt.

Ich drücke Dir die Daumen, dass Du bzw. Deine Chins die Giardien los seid. Bei mir reichte damals eine Behandlung mit 2 Zyklen.

Bedenke bitte, dass sich die Giardien im Auslaufbereich noch lange "halten" können und deswegen entweder der Auslauf noch unterbleiben sollte, oder, falls Du den Bereich mit Hitze behandeln kannst, dies zu tun, bevor sie laufen dürfen.

LG speedy

---